



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA
DIVISÃO DE FARMÁCIA

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO	LABORATÓRIO	DILUENTE(S)	ESTABILIDADE APÓS DILUIÇÃO	OBSERVAÇÕES
Atracúrio 10mg/mL	Ampola 2,5mL	Cristalia	SF 0,9%; SG 5%	24h sob refrigeração ou TA Requer proteção da luz	Solução incolor à levemente amarelada
Dobutamina 12,5mg/mL	Ampola 20mL	Teuto	SF 0,9%; SG 5%; RL	24h em TA	Solução límpida amarelada. Pode exibir coloração rosa mais intensa com o tempo, sem perda significativa do efeito
Dopamina 5mg/mL	Ampola 10mL	Cristalia	SF 0,9%; SG 5%	24h em TA Requer proteção da luz	Solução incolor ou levemente amarela; descartar se ficar escura ou com outra coloração
Epinefrina ou Adrenalina 1mg/mL	Ampola 1mL	Hipolabor	SF 0,9%; SG 5%	24h em TA Requer proteção da luz	Solução incolor à levemente amarelada com odor característico
Fentanil 78,5mcg/mL	Ampola 2mL	União Química/Cristalia	SF 0,9%; SG 5%	24h em TA	Solução incolor isenta de partículas
Fentanil 50mcg/mL	Ampola 10mL	Cristalia	SF 0,9%; SG 5%	24h em TA (SF 0,9%) 6h em TA (SG5%)	Solução incolor com odor característico
Furosemida 10mg/mL	Ampola 2mL	Farmace	SF 0,9%; RL	24h em TA ou sob refrigeração Requer proteção da luz	solução límpida, incolor e isenta de partículas em suspensão
Insulina Regular 100UI/mL	F/A 10mL	Aspen Pharma	SF 0,9%; SG 5% e 10%	24h em TA Não congelar	Líquido claro e incolor. Saturar os locais de ligação no frasco e equipo e aguardar 20min antes da infusão
Midazolam 5mg/mL	Ampola 3mL	Teuto	SF 0,9%; SG 5%; RL	24h em TA	Líquido incolor a levemente amarelado com odor característico
Midazolam 5mg/mL	Ampola 10mL	Hipolabor	SF 0,9%; SG 5%; RL	24h em TA	Líquido incolor a levemente amarelado com odor característico
Milrinona 1mg/mL	Ampola 10mL	Sanofi	SF 0,9%; SG 5%	24h em TA Requer proteção da luz	líquido límpido, incolor a amarelo pálido

Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/mL	Ampola 4mL	Hipolabor	SG 5%	24h em TA Requer proteção da luz	Solução incolor ou praticamente incolor. Aceitar até uma coloração levemente amarelada; descartar solução se ficar amarronzada ou tiver precipitado
Nitroprusseto de sódio 25mg/mL	Ampola 2mL	Hypofarma	SG 5%	24h em TA Requer proteção da luz	Solução vermelho âmbar. Pode causar irritação
Rocurônio 10mg/mL	Ampola 5mL	Cristalia	SF 0,9%; SG 5%; RL; Água p/ Inj.	24h em TA	Solução límpida, essencialmente livre de partículas. Incolor a levemente amarelada
Salbutamol 0,5mg/mL	Ampola 1mL	Hipolabor	SF 0,9%; SG 5%	24h em TA	Solução incolor a amarelo pálido com odor carecterístico
Vasopressina 20UI/mL	Ampola 1mL	Biolab	SF 0,9%; SG 5%	18h em TA ou 24h Refr.	solução incolor, límpida e livre de partículas

***OBS.: TODOS OS MEDICAMENTOS ANTES DE SEREM DILUÍDOS DEVEM SER ARMAZENADOS PROTEGIDOS DA LUZ.**

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O SERVIÇO DE FARMÁCIA.

Referências Bibliográficas:

1. TRISSEL L. A. Handbook on Injectable Drugs. 16 ed. Richmond, TX, USA. American Society of Health-System Pharmacists, 2011.
2. MICROMEDEX. Miromedex. Healthcare Series. Disponível em: www.micromedex.com.br. Acesso em: 17/03/2016.
3. ANVISA. Bulário eletrônico. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp. Acesso em 17/03/2016

Elaborado por: *Farmacêutica Marcia Gisele em 07/2015*

Revisado por: *Farmacêutica Residente Carolina Brito em 09/2017 e Farmacêutica Residente Thais Fernandes em 10/2017*

Revisado por: *Farmacêutica Amanda Cabral dos Santos em 06/2018*